Computeralgebra

SS 2000
Prof. Dr. K. Madlener
Übungsblatt 9

Aufgabe 9.1
Zeigen oder widerlegen Sie:

a) Das Polynom $x^{1000} + 2 \in \mathbb{Z}_5[x]$ ist quadratfrei.

b) Sei F ein Körper und seien $f, g \in F[x]$. Dann ist der quadratfreie Anteil von fg das Produkt der quadratfreien Anteile von f und g.

Der quadratfreie Anteil eines Polynoms $h = \prod_{1 \leq i \leq r} h_i^{e_i}$ ist dabei $\prod_{1 \leq i \leq r} h_i$ (mit paarweise verschiedenen irreduziblen h_i).

Aufgabe 9.2
Faktorisieren Sie das Polynom $x^8 + x^7 + 2x^6 + 3x^5 + 3x^4 + 3x^3 + 2x^2 + 2x + 1$ mit der Distinct-Degree-Methode jeweils über $\mathbb{Z}_7[x]$, $\mathbb{Z}_{19}[x]$ und $\mathbb{Z}_{23}[x]$.

Aufgabe 9.3
Wie viele Faktoren hat $a(x) = x^4 + 1 \in \mathbb{Z}_p[x]$ (p prim), wenn (i) $p = 2$, (ii) $p \equiv 1 \pmod 8$, (iii) $p \equiv 3 \pmod 8$ bzw. (iv) $p \equiv 5 \pmod 8$?

Aufgabe 9.4
Betrachten Sie die deterministische Variante des Berlekamp-Algorithmus in Geddes et al. auf Seite 352 (Algorithm 8.4). Wieso genügt es im letzten Abschnitt, die größten gemeinsamen Teiler $\mathrm{ggT}(v^{[r]} - s, u)$ für die Basispolynome $v^{[2]}, \ldots, v^{[k]}$ der Nullraumbasis von $Q - I$ zu berechnen, um eine vollständige Faktorisierung zu erhalten?

Aufgabe 9.5
Sei $p \in \mathbb{Z}$ prim und $n > 1$. Zeigen Sie die folgenden „pathologischen“ Eigenschaften von $R = \mathbb{Z}_{p^n}[x]$ ($f, g \in R$):

a) Es gilt nicht notwendigerweise $\deg fg = \deg f + \deg g$.

b) R ist kein ZPE-Ring.

c) Es ist $\mathrm{ggT}(f, g)$ nicht notwendigerweise als Linearkombination von f und g darstellbar.

Abgabe am 20.6.2000 bis 10.30 Uhr, Übungskasten in Bau 34, zweites OG.

Informationen zur Vorlesung:
http://www-madlener.informatik.uni-kl.de/ag-madlener/lectures/compalg/ss2000/compalg.html